

FRECUENCIA DE LAS DOSIS, NUMERO DE MEDICAMENTOS, DURACION

En general, utilizamos cinco gotas de cada microdosis cuatro veces al día con intervalos de 1 minuto, aplicadas sobre la lengua o en cualquier parte de la boca (pues invariablemente la solución llegará a las papilas gustativas). Cuando deseamos efectos locales como es el caso de amigdalitis o padecimientos de las encías y recomendamos el uso de Sangre de Drago, se aplicarán doce gotas para gargarismos antes de pasarlas; o fricción sobre la encía cuatro veces al día.

No debe haber tomado ningún producto

En el caso de enfermedades graves o cuadros agudos severos se administran cinco gotas del fármaco principal cada cinco minutos hasta 1 hora; por ej. Para un cuadro infeccioso; Estafiate, con límite máximo de una hora, aún cuando al cabo de seis u ocho dosis el paciente ya mejoró a continuación dar el medicamento 5 gotas cada hora por un lapso de 24 horas, para proseguir administrándolo cuatro veces al día.

Numerosos pacientes padecen varias enfermedades simultáneamente, para ellos se prescribirán las diferentes microdosis diarias pero separado un medicamento de otro por un minuto, pueden ser hasta 10 o 12 microdosis diferentes.

El tratamiento se sostiene mientras existan los síntomas o signos de enfermedad, más un tiempo igual al que tardó en aliviarse, para evitar recaídas.

Para enfermedades crónicas puede ser necesario sostener el tratamiento indefinidamente; en caso de haber algún rechazo o falta de respuesta puede administrarse un medicamento alterno.

Si el paciente muestra repugnancia o cualquier forma de rechazo a cierto medicamento, debe suspenderse, para ello es que RECOMENDAMOS administrar las microdosis separadamente por un lapso de un minuto por lo menos.

CASOS ESPECIALES

VITILIGO – Aplicar localmente la microdosis de VITILIGO, esperar a que seque, aplicar PLACENTA.

El de TABAQUISMO y ALCOHOLISMO se toman 7 gotas en la punta de la lengua en ayunas y 7 gotas cuando vaya a ir una reunión y/o cuando sienta el deseo de fumar o tomar.

Del de INSOMNIO se pueden tomar en la noche cada hora si no le es posible adquirir el sueño.

Para todos los anteriores hay que tomar todas las microdosis 4 veces al día de la forma descrita en general.